

1. O retalho lateral do braço é baseado na artéria colateral:
 - a) ulnar anterior
 - b) radial anterior
 - c) ulnar posterior
 - d) radial posterior
 - e) cubital superior
2. O retalho inguinal, popularizado por McGregor e Jackson, é nutrido pela artéria:
 - a) inguinal
 - b) artéria epigástrica inferior
 - c) ilíaca circunflexa profunda
 - d) ilíaca circunflexa superficial
 - e) femoral superficial
3. A artéria tóraco-dorsal, principal suprimento vascular do retalho grande dorsal, é a continuação da artéria:
 - a) subescapular
 - b) torácica longa
 - c) cervical
 - d) supra-escapular
 - e) serrátil anterior
4. O retalho da artéria interóssea posterior pode ser usado para cobrir defeitos na mão, até o dorso da:
 - a) falange média
 - b) falange proximal
 - c) articulação metacarpofalângica
 - d) articulação interfalângica proximal
 - e) falange distal
5. O maior obstáculo para a sobrevivência de um enxerto de pele é o(a):
 - a) calor
 - b) infecção
 - c) umidade
 - d) rejeição
 - e) hematoma
6. O retalho dorsal do pé tem como vantagem:
 - a) a dissecação tecnicamente fácil
 - b) o grande calibre do seu pedículo arteriovenoso
 - c) o grande tamanho, frequentemente usado para cobrir áreas em torno de 10x10cm
 - d) as mínimas complicações no leito doador, pois é um retalho que não pode ser inervado
 - e) o pequeno calibre de seu pedículo arteriovenoso
7. A artéria que nutre o retalho escapular é o ramo:
 - a) cutâneo transversal da circunflexa da escápula
 - b) profundo transversal da circunflexa da escápula
 - c) anterior transversal da circunflexa da escápula
 - d) posterior transversal da circunflexa da escápula
 - e) interna transversal da circunflexa da escápula
8. O retalho anterolateral da coxa é potencialmente sensível por incorporar o nervo:
 - a) ciático poplíteo lateral
 - b) cutâneo femoral lateral
 - c) ciático poplíteo medial
 - d) cutâneo femoral medial
 - e) ciático femoral externo
9. Na confecção de uma zetaplastia, a angulo ideal entre as incisões deve ser:
 - a) 30°
 - b) 45°
 - c) 60°
 - d) 90°
 - e) 180°
10. Os enxertos de pele total, em relação aos parciais, têm:
 - a) áreas doadoras que cicatrizam por segunda intenção
 - b) "pega" mais fácil
 - c) menor tendência a infecção
 - d) melhor indicação para cobertura na palma da mão
 - e) maior tendência à necrose
11. Sobre as diferenças entre pele palmar e dorsal da mão, a alternativa correta é:
 - a) a pele dorsal apresentar maior quantidade de terminações nervosas, é mais sensível ao calor.
 - b) a pele palmar tem maior acolchoamento subcutâneo e apresenta maior mobilidade.
 - c) a pele dorsal se assemelha à pele do resto do corpo enquanto que a palmar se assemelha à da planta do pé.
 - d) a pele palmar tem menor espessura que a dorsal.
 - e) a pele dorsal tem maior espessura que a pele palmar.

12. É considerado fator de risco para a cicatrização cutânea:
- a) Hipertensão
 - b) Hipotireoidismo
 - c) Hipotensão arterial
 - d) Hiperventilação
 - e) Hipertireoidismo
13. O efeito do diabetes sobre a cicatrização cutânea é:
- a) Redução do oxigênio tissular
 - b) Vasodilatação
 - c) Elevação do pH
 - d) Aumento da pressão arterial
 - e) Vasoconstrição
14. O efeito deletério do fumo sobre o fluxo sanguíneo de um retalho cutâneo:
- a) redução da frequência cardíaca
 - b) vasoconstrição
 - c) retardo de consolidação
 - d) aumento da temperatura corporal
 - e) hipoglicemia
15. A alternativa ideal para a cobertura de uma perda cutânea extensa localizada na face anterior do antebraço com exposição exclusiva muscular, sem sinais de infecção e com leito bem vascularizado, é:
- a) Enxerto de pele parcial
 - b) Retalho ilhado
 - c) Retalho muscular
 - d) Retalho microcirúrgico
 - e) Retalho livre
16. Para uma ferida com perda de substância cutânea da mão e exposição óssea, a melhor alternativa de cobertura é:
- a) Enxerto de pele total
 - b) Enxerto de pele parcial
 - c) Cicatrização por segunda intenção
 - d) Retalho cutâneo
 - e) Retalho fasciocutâneo
17. Assinalar entre os itens abaixo um risco do uso prolongado dos curativos a vácuo:
- a) Hematomas
 - b) Manutenção da infecção
 - c) Contraturas
 - d) Compressão neural
 - e) Edema crônico
18. Qual dos retalhos abaixo é indicado na cobertura cutânea da polpa polegar:
- a) kite
 - b) chinês
 - c) Interósseo anterior
 - d) Lateral do braço
 - e) Enxerto livre
19. O retalho indicado para perdas cutâneas no dorso da mão é:
- a) V-Y
 - b) retalho livre lateral do braço
 - c) cross finger
 - d) enxerto de pele parcial
 - e) retalho reverso
20. São requisitos para a reconstrução cutânea da ponta do dedo amputada, **EXCETO**:
- a) sensibilidade funcional
 - b) estabilidade
 - c) ausência de fratura
 - d) ausência de dor
 - e) fratura
21. O teste da gaveta anterior do tornozelo avalia a integridade de qual ligamento:
- a) fibulotalar anterior
 - b) fibulotalar posterior
 - c) tibiotalar anterior
 - d) tibiotalar posterior
 - e) ulnar anterior
22. Sobre a anatomia do plexo braquial, assinale a alternativa correta.
- a) C6 e C7 formam o tronco médio
 - b) C8 e T1 formam o fascículo medial
 - c) C7 e C8 formam o fascículo lateral
 - d) o nervo axilar é formado por C6 e C7
 - e) o nervo axilar é formado por C5
23. O paciente portador de hérnia de disco lombar com compressão da raiz S1 apresenta:
- a) alteração sensitiva na borda medial da perna
 - b) reflexo patelar diminuído ou abolido
 - c) alteração motora do tríceps sural
 - d) marcha escarvante e pé caído
 - e) sensação de fraqueza

- 24.** Na doença de SCHEUERMANN, o diagnóstico diferencial mais comum é:
- a) cifose postural
 - b) cifose congênita
 - c) espondilite infecciosa
 - d) fratura por compressão
 - e) espondilite inflamatória
- 25.** Na osteonecrose da cabeça femoral, o sinal radiográfico patognomônico é:
- a) da linha simples
 - b) da linha dupla
 - c) da corcova
 - d) do crescente
 - e) presença de inflamação
- 26.** Na artroplastia total do quadril, o fator mais importante na formação do hematoma pós-operatório é:
- a) a discrasia sanguínea
 - b) o uso de medicação anti-coagulante
 - c) o uso de medicação anti-inflamatória
 - d) a hemostasia intraoperatória inadequada
 - e) uso de medicação antiglicêmica
- 27.** Para o pé plano valgo flexível, indica-se o tratamento com palmilhas:
- a) quando houver sintomas
 - b) se o JACK TEST for negativo
 - c) nos pacientes do sexo masculino
 - d) nos primeiros quatro anos de idade
 - e) nos primeiros sete anos de idade
- 28.** No pé diabético, segundo a classificação de WAGNER, a presença de exposição de tendões corresponde ao grau:
- a) 1
 - b) 2
 - c) 3
 - d) 4
 - e) 5
- 29.** Na fratura-luxação de MONTEGGIA, o nervo corre maior risco de lesão é:
- a) radial
 - b) musculocutâneo
 - c) mediano
 - d) interósseo posterior
 - e) anterior
- 30.** Na fratura subtrocantérica, a deformidade em flexão e rotação lateral do fragmento proximal é promovida pelo músculo:
- a) iliopsoas
 - b) quadríceps femoral
 - c) glúteo médio
 - d) adutor magno
 - e) adutor curto
- 31.** A fascite plantar cursa com dor:
- a) bilateral
 - b) que é pior na pisada logo depois de acordar
 - c) que melhora na pisada após um período sentado
 - d) localizada na região ífero-lateral da tuberosidade do calcâneo
 - e) piora com o repouso
- 32.** Considerando-se os corredores de segurança para colocação de um fixador externo, está correta a seguinte relação estrutura – posição anatômica:
- a) neuro radial – anterior no terço médio do braço
 - b) nervo fibular – lateral no terço proximal da perna
 - c) artéria poplíteia – lateral no terço distal da coxa
 - d) artéria tibial posterior – lateral no terço distal da perna
 - e) nervo fibular – anterior no terço médio da coxa
- 33.** O principal fator limitante para o alongamento ósseo é:
- a) qualidade óssea
 - b) condições de partes moles
 - c) contraturas articulares
 - d) força muscular
 - e) contratura muscular
- 34.** No escorregamento da epífise proximal do fêmur:
- a) a zona hipertrófica aumenta, podendo ocupar até 80% da espessura da placa
 - b) epifisária
 - c) a zona de repouso geralmente está hipocelular
 - d) a placa epifisária é frequentemente hipercelular
 - e) as fibras de colágeno estão diminuídas na zona hipertrófica

- 35.** Uma criança com displasia do desenvolvimento do quadril que apresenta, ao exame físico, o sinal de HART está com contratura no músculo:
- a) adutor magno
 - b) adutor longo
 - c) glúteo médio
 - d) glúteo máximo
 - e) adutor médio
- 36.** O exame padrão-ouro para o diagnóstico da osteoporose é:
- a) ultrassonografia quantitativa
 - b) radiografia simples
 - c) densitometria óssea
 - d) ressonância nuclear magnética
 - e) hemograma completo
- 37.** Na doença de PAGET, a biópsia geralmente revela um padrão em:
- a) mosaico
 - b) paliçada
 - c) roda de carroça
 - d) tela de galinheiro
 - e) cortiza
- 38.** O principal diagnóstico diferencial da metástase óssea é:
- a) condrossarcoma
 - b) tumor de células gigantes
 - c) mieloma múltiplo
 - d) osteossarcoma
 - e) sarcoma de EWING
- 39.** O tumor de DAHLIN, chamado de "osteoma osteóide gigante", é:
- a) condroblastoma
 - b) osteoblastoma
 - c) hemangioma intraósseo
 - d) tumor de células gigantes
 - e) fibrossarcoma
- 40.** Na fratura do escafoide, a síndrome navículo-capitato caracteriza-se por:
- a) ruptura do ligamento escafocapitato
 - b) luxação médio-carpal incluindo o escafoide
 - c) fratura do capitato com rotação do fragmento proximal
 - d) luxação axial do carpo entre as colunas central e medial
 - e) luxação periulnar do carpo



UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ
PROCESSO SELETIVO UNIFICADO PARA RESIDÊNCIA MÉDICA 2018/2
Grupo H: Cirurgia de Mão
Especialidades: Cirurgia Plástica ou Ortopedia e Traumatologia

GABARITO DO CANDIDATO

O gabarito poderá ser copiado, **SOMENTE**, no espelho constante no final do boletim de questões disponibilizado para este fim que somente será destacado no final de sua prova, pelo fiscal de sua sala.

| QUESTÃO | ALTERNATIVA | QUESTÃO | ALTERNATIVA |
|---------|-------------|---------|-------------|
| 1 | | 21 | |
| 2 | | 22 | |
| 3 | | 23 | |
| 4 | | 24 | |
| 5 | | 25 | |
| 6 | | 26 | |
| 7 | | 27 | |
| 8 | | 28 | |
| 9 | | 29 | |
| 10 | | 30 | |
| 11 | | 31 | |
| 12 | | 32 | |
| 13 | | 33 | |
| 14 | | 34 | |
| 15 | | 35 | |
| 16 | | 36 | |
| 17 | | 37 | |
| 18 | | 38 | |
| 19 | | 39 | |
| 20 | | 40 | |