

1. A integralidade, como princípio do Sistema Único de Saúde (SUS), está fortemente associada à/ao(s):
 - a) rede assistencial.
 - b) trabalho em equipe.
 - c) marcos organizativos.
 - d) atenção primária em saúde.
 - e) marcos doutrinários.
2. A Política Nacional da Atenção Básica está, prioritariamente, organizada a partir da:
 - a) humanização do atendimento.
 - b) rede de serviços assistenciais.
 - c) educação permanente.
 - d) estratégia saúde da família.
 - e) linha de cuidado.
3. A coordenação, articulação, planejamento, controle, avaliação e auditoria dos Sistemas de Saúde Estaduais e Municipais são condições essenciais para:
 - a) o atendimento das diretrizes constitucionais.
 - b) a Resolubilidade da atenção à saúde na perspectiva da assistência integral como princípio do Sistema Único de Saúde-SUS.
 - c) a Gestão eficiente e eficaz para o controle do funcionamento do Sistema Único de Saúde-SUS.
 - d) a segurança dos usuários dos serviços considerando as condições de organização e funcionamento do Sistema Único de Saúde-SUS.
 - e) o pleno funcionamento do sistema de informação das ações e atividades desenvolvidas pelos serviços de saúde do Sistema Único de Saúde-SUS.
4. Os fundamentos e principais atributos da rede de atenção à saúde corresponde a:
 - a) integração horizontal dos serviços.
 - b) estratégia para a articulação dos serviços de saúde.
 - c) descentralização da gestão.
 - d) universalização do cuidado.
 - e) integralidade.
5. A pandemia do Coronavírus em curso, ainda exige análises conjunturais e epidemiológicas para a mitigação do processo de transmissão e a adoção de estratégias assistenciais na perspectiva da redução do agravo às populações exigindo que vários fatores sejam levados em consideração em um cenário incerto. Dentre eles releva-se:
 - a) as características locais, sociais e demográficas.
 - b) a capacidade da gestão local.
 - c) as descobertas farmacológicas.
 - d) diferenças culturais.
 - e) as características socioeconômicas.
6. Em tempos de pandemia, o mecanismo mais eficaz para avaliar as possibilidades de isolamento domiciliar das pessoas suspeitas de diagnóstico da Covid-19, pelo agente comunitário de saúde, na sua área de atuação é a vigilância:
 - a) sanitária.
 - b) passiva.
 - c) ativa.
 - d) da saúde.
 - e) na saúde.
7. Nas Redes de Atenção a Saúde são características das Linhas de Cuidado:
 - a) os cuidados assistenciais prestados de forma estruturada por nível de complexidade dos serviços de saúde.
 - b) um *continuum* assistencial composto por ações de promoção, prevenção, tratamento e reabilitação.
 - c) os níveis organizativos das ações da promoção a reabilitação da saúde.
 - d) os serviços de prestação da assistência da promoção a reabilitação da saúde.
 - e) um *continuum* organizacional composto por ações de promoção, prevenção, tratamento e reabilitação.
8. A condição crônica se caracteriza, fundamentalmente, por ser tudo aquilo que está associada aos:
 - a) casos de doenças de cunho social e assistencial a serem atendidos pelo sistema de saúde.
 - b) casos que exigem uma resposta social deliberada por parte do sistema de saúde.
 - c) pacientes idosos com vulnerabilidade social.
 - d) pacientes portadores de doenças crônicas que exigem a atenção integral e intersetorial.
 - e) cidadãos e cidadãs vulneráveis social e economicamente.
9. Uma das funções da equipe de saúde nas condições crônicas é:
 - a) apoiar tecnicamente os portadores de doenças crônicas.
 - b) identificar os fatores proximais das condições de saúde da área.
 - c) encaminhar aos especialistas no campo assistencial e social.
 - d) apoiar as pessoas para o autocuidado.
 - e) identificar a capacidade de respostas do sistema de saúde.

- 10.** A nova forma de financiamento, pelo Ministério da Saúde, das ações da Atenção Primária em Saúde desenvolvidas nos municípios é denominada de Programa:
- a Nacional de Atenção Básica.
 - b Previne Brasil.
 - c Saúde da Família.
 - d Nacional de Melhoria da Qualidade.
 - e Avança Brasil.
- 11.** A interprofissionalidade e a autonomia são características do(a):
- a organização da rede de serviços de saúde.
 - b processo de trabalho em saúde.
 - c linha de cuidado assistencial hierarquizada.
 - d princípio da integralidade ou atenção integral.
 - e educação permanente.
- 12.** Para receberem os recursos financeiros com base nas novas formas de financiamento os municípios precisam, fundamentalmente, alcançar:
- a eficiência.
 - b eficácia.
 - c produtividade.
 - d objetivos definidos pelas Secretarias Municipais de Saúde.
 - e indicadores de desempenho satisfatórios.
- 13.** Um dos principais focos das diretrizes para segurança do paciente é:
- a o profissional de saúde.
 - b o usuário do serviço de saúde.
 - c a participação do paciente.
 - d o envolvimento do gestor.
 - e estrutura física dos serviços e equipe de saúde.
- 14.** O atual modelo de financiamento da Atenção Primária em Saúde é formado:
- a pela captação ponderada, pagamento por desempenho e por incentivos a estratégias e programas.
 - b pelo piso nacional de atenção básica fixo e variável e captação ponderada e pagamento por desempenho.
 - c pelo Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica, pelo piso nacional de atenção básica e por incentivos a estratégias programadas.
 - d pela Estratégia Saúde da Família, Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da atenção básica e pelo piso nacional de Atenção Básica.
 - e Pelo incentivo a estratégias e Programas e Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica.
- 15.** O fator essencial na definição de diretrizes para a segurança do paciente é:
- a experiência profissional.
 - b proatividade profissional.
 - c cultura organizacional e sistema de aprendizado.
 - d identificação das causas dos erros cognitivos.
 - e compromisso institucional.
- 16.** G2 P0 A1, 26 anos, veio a unidade hospitalar informando ser sua segunda gestação porém, ao iniciar seu pré-natal, a enfermeira da unidade contra referenciou para o hospital por sua ultrassonografia revelar gestação heterotópica em região cornual próximo ao terço distal. O provável diagnóstico e a conduta a ser tomada, neste caso, é:
- a gestante encontra-se com Doença Trofoblástica Gestacional (Gestação Molar) e a resolução clínica seria curetagem uterina ou a Aspiração Manual Intra Uterina (AMIU).
 - b gestante encontra-se com Gestação Tubária e a conduta cirúrgica é laparotomia exploradora.
 - c gestante encontra-se com Gestação Anembrionada e a conduta seria curetagem uterina.
 - d gestante encontra-se com ameaça de abortamento e precisa ficar internada para realizar nova ultrassonografia.
 - e gestante encontra-se com óbito fetal intrauterino e a conduta seria parto cesariano.
- 17.** O lábio leporino é uma malformação anatômica que ocorre, geralmente, em torno da quarta e décima segunda semana de vida intrauterina, respectivamente por falta ou deficiência de _____ e _____ ou dos _____. A etiologia das fissuras abiopalatinas é controversa, não sendo portanto possível isolar um fator causal específico. Assinale a alternativa que indica os fatores que podem determinar o aparecimento de tais fissuras.
- a fusão dos processos maxilar/ e nasal médio/ ou dos processos palatinos, tendo como fatores ambientais, genéticos, ou ambos fatores.
 - b fusão dos cranianos/ e faciais posterior/ ou dos processos palatinos, tendo como fatores medicamentosos e genéticos.
 - c fusão dos processos maxilar/ e nasal médio/ ou dos processos palatinos, tendo como fatores medicamentosos e genéticos.
 - d fusão dos processos palatais/ e faríngeo, tendo como processo os fatores ambientais, genéticos/ ou ambos os fatores.
 - e fusão dos processos otológicos/ e nasais médio, tendo como processo os fatores citogenéticos ou um dos processos semíticos.

- 18.** A diferença clínica entre a Gastrosquise e a Onfalocele é que a primeira determina um defeito congênito da parede abdominal, onde exterioriza órgãos da cavidade abdominal, no entanto a Onfalocele caracteriza-se em um defeito congênito da parede abdominal, onde exterioriza órgãos da cavidade abdominal, mas a diferença da gastrosquise é que há uma membrana avascularizada transparente cobrindo as estruturas do abdômen. Dentre os cuidados emergenciais de enfermagem à estes recém nascidos na sala de parto deve-se:
- a** cobrir os órgãos exteriorizados com água destilada gelada e envolver com gaze estéril para o procedimento cirúrgico.
 - b** reintroduzir os órgãos exteriorizados para dentro da cavidade e realizar um curativo oclusivo compressivo.
 - c** lavar os órgãos exteriorizados com água morna e cobrir com gaze estéril.
 - d** cobrir os órgãos exteriorizados com soro fisiológico morno e envolver com plástico estéril para o procedimento cirúrgico.
 - e** reintroduzir os órgãos exteriorizados para dentro da cavidade e encaminhá-lo para o bloco cirúrgico.
- 19.** A termorregulação é uma função fisiológica capaz de controlar e manter um ambiente corporal neutro. Valores descontrolados são considerados fator de risco para a morbimortalidade neonatal, uma vez que agrava ou favorece distúrbios metabólicos, desconforto respiratório, enterocolite necrosante e hemorragia intracraniana. Partindo do entendimento de que a segurança do paciente é definida como a ausência de danos evitáveis e a redução de riscos desnecessários associados aos cuidados com a saúde a um mínimo aceitável, a atenção à termorregulação do RN durante o período pós nascimento torna-se foco da assistência de enfermagem quanto ao atendimento ao recém-nascido prematuro menor de 34 semanas da sala de parto. Nesse sentido, deve-se:
- a** manter a temperatura corporal entre 36,5 e 37,0°C, mantendo temperatura ambiente de 26°C.
 - b** manter a temperatura corporal entre 35,4 e 36,8°C, mantendo a temperatura ambiente de 36°C.
 - c** manter a temperatura corporal entre 36,6 e 37,5°C, mantendo a temperatura ambiente de 36°C.
 - d** manter a temperatura corporal entre 35,5 e 37,0°C, mantendo a temperatura ambiente de 26°C.
 - e** manter a temperatura corporal entre 37,5 e 38,0°C, mantendo a temperatura ambiente de 35°C.
- 20.** A prevalência da infecção por HCV (Vírus da Hepatite C) em mulheres em idade fértil corresponde cerca de 1% nos EUA, porém o período gestatório não altera a evolução da infecção por HVC, embora vários estudos tenham demonstrado declínio dos marcadores bioquímicos de citólise hepática durante a gestação. Quanto à amamentação o mais recomendável pela enfermagem é:
- a** liberada à livre demanda.
 - b** por ser considerada um fator de risco recomenda-se a alimentação cruzada.
 - c** a segurança da amamentação depende da integridade dos mamilos, não havendo aumento do risco de transmissão perinatal pelo HCV.
 - d** atualmente não há nenhuma recomendação específica para o caso pelo Ministério da Saúde.
 - e** alimentação mais prudente é a fórmula láctea.
- 21.** Gestante Menor, 14 anos deu entrada em uma maternidade pública em Mãe do Rio-PA com quadro clínico de: dor pélvica intermitente, (Contração Uterina) 3C/10'/45", eliminação de líquido com presença de lanugo por via vaginal, diminuição dos movimentos fetais, colo uterino pérvio para 3cm, Tax:38,6°C há 2dias, episódios de calafrios, (Data da última menstruação) DUM: 05.04.20. Em relação ao caso descrito é correto afirmar que:
- a** está em franco trabalho de parto à termo, ID: vaginose, conduta correta seria: internação + parto cesareano, prognóstico fetal: bom.
 - b** está em pródomos de trabalho de parto, ID: Amniorrex prematura, conduta correta seria: medicá-la, após orientá-la e liberá-la para casa, prognóstico fetal: bom.
 - c** está em processo de trabalho de parto prematuro, ID: Amniorrex prematura + corioamnionite, conduta correta seria: internação, infusão líquida venosa, corticoide, antibióticos e indução ao parto vaginal, prognóstico fetal: sombrio.
 - d** está em processo de trabalho de parto prematuro, ID: Vaginose + ITU, conduta correta seria: internação, infusão líquida venosa, corticoide, antibióticos, prognóstico fetal: regular.
 - e** está em franco trabalho de parto pós termo, ID: Amniorrex prematura + infecção uterina + sofrimento fetal, conduta correta seria: solicitar USG Obstétrico, internar para observar, prognóstico fetal: regular.

- 22.** Em recente revisão sistemática que reuniu dados de 131 estudos publicados até 14 de maio de 2020, totalizando 7.780 pacientes pediátricos de 26 países diferentes, os autores reforçaram evidências prévias de que crianças diagnosticadas com COVID-19 apresentam em geral, um bom prognóstico e baixa taxa de mortalidade (Veronez et Lopes-Junior, 2020). Dentre as consequências negativas substanciais em cuidados a crianças com câncer portadoras de COVID-19, destacam-se:
- a** atrasos em consultas e/ou modificações em esquemas de tratamentos, e diminuição nas equipes de onco-hematologia pediátrica.
 - b** surgimento de metástases mesmo mantendo o esquema terapêutico já iniciado para o câncer e com a inclusão dos medicamentos específicos para COVID-19.
 - c** aparecimento de manchas nazo-orais, ressecamento da pele, hipertermia.
 - d** falta de um guia clínico mundial que auxilie os profissionais de saúde que possa ajudar a gerenciar as demandas da pandemia e nortear preparações para impactos a longo prazo com diagnóstico tardio.
 - e** a incerteza de um tratamento quimioterápico que possa tratar o câncer frente ao COVID-19.
- 23.** De acordo com os atuais conceitos de gerontologia, o idoso capaz de manter sua autodeterminação e que dispensa qualquer ajuda ou supervisão para agir no seu cotidiano, é considerado saudável, ainda que possua uma ou mais de uma doença crônica. Decorre daí o conceito de capacidade funcional, ou seja, a capacidade de manutenção das habilidades físicas e mentais necessárias a uma vida independente e autônoma. Conforme o exposto do ponto de vista da saúde pública, a capacidade funcional do idoso dentre os critérios estabelecidos pelas diretrizes gerais são:
- a** tratamento não especializado e informalidade da atenção terciária.
 - b** promoção específica da saúde mental e readequação das estratégias da saúde primária.
 - c** tratamento específico à saúde mental em consonância a saúde psicomotora.
 - d** promoção do envelhecimento saudável e reabilitação da capacidade funcional comprometida.
 - e** readequação à saúde mental e promoção à saúde psicossocial.
- 24.** Os cuidados paliativos ao cliente pediátrico com câncer fora de possibilidade de cura lidam com a possibilidade de morte iminente da criança e promove uma série de situações desgastantes no âmbito psicológico, tanto para o cliente e sua família quanto para o profissional. Na equipe de Cuidados Paliativos, a enfermeira desempenha um papel ímpar, cujo cuidado abrange uma visão humanística que considera não somente a dimensão física, mas também as preocupações psicológicas, sociais e espirituais do paciente. Apesar da impossibilidade de cura, isso não significa a deterioração da relação enfermeiro-paciente, neste contexto crítico, a principal dificuldade enfrentada pelos enfermeiros nos cuidados paliativos no paciente terminal é:
- a** uma remuneração profissional compatível com a complexidade da assistência a ser prestada.
 - b** um curso de aprimoramento específico para a clientela pediátrica em cuidados paliativos.
 - c** uma lei específica que ampare o profissional de enfermagem que atua com pacientes pediátricos em fase terminal de câncer.
 - d** uma preconização sistemática de enfermagem voltada ao paciente oncológico pediátrico.
 - e** desenvolver meios para providenciar um cuidado de enfermagem sensível que permita a manutenção da saúde simultaneamente em confronto com a natureza terminal da doença.
- 25.** A violência laboral foi uma questão menosprezada durante muito tempo, porém, nos últimos anos, tem sido uma preocupação prioritária, tanto em países industrializados, como em desenvolvimento. Várias denominações têm sido utilizadas, em diferentes estudos, para se referir a este tipo de situação, em que colegas de trabalho, superiores, subordinados, de forma sistemática, intimidam, atormentam, assediam ou perseguem um funcionário no trabalho. Na enfermagem, o assédio moral tem sido denominado como:
- a** Hostigamento psicológico
 - b** Bullying laboral
 - c** Assédio sumário
 - d** Afrontamento emocional
 - e** Aterrorização sequenciada

- 26.** A tipologia clássica classifica as doenças em transmissíveis e em doenças crônicas não transmissíveis, tendo como critério a etiopatogenia. Por essa razão, surgiu, recentemente, a proposta de condições de saúde entendida como as circunstâncias que se apresentam de forma mais ou menos persistentes na saúde das pessoas e que exigem respostas sociais reativas ou proativas, episódicas ou contínuas, e fragmentadas ou integradas dos sistemas de atenção à saúde, dos profissionais de saúde e das pessoas usuárias. Dentre as condições de saúde supracitadas, as mesmas se dividem em:
- a** Surto e Epidemia
 - b** Agudas e crônicas
 - c** Epidemia e Pandemia
 - d** Reativas e Esporádicas
 - e** Traumática e Não Traumática
- 27.** Assinale a alternativa que corresponde às características do sistema de saúde na perspectiva da Gestão da clínica na Atenção Primária à Saúde no Sistema Único de Saúde.
- a** Organização em rede referenciada a um território sanitário; Gestão sistêmica, compartilhada e corresponsável; Financiamento por procedimentos; Atenção integral, orientada às necessidades de saúde e centrada no cuidado multiprofissional.
 - b** Organização em rede referenciada a um território sanitário; Gestão sistêmica, compartilhada e corresponsável; Financiamento por resultados; Atenção integral, orientada às necessidades de saúde e centrada no cuidado multiprofissional.
 - c** Organização hierárquica entre serviços; Financiamento por resultados; Padrões de segurança e qualidade; Atenção integral, orientada às necessidades de saúde e centrada no cuidado multiprofissional.
 - d** Organização hierárquica entre serviços; Financiamento por resultados; Atenção orientada às doenças e centrada no cuidado profissional; Gestão sistêmica, compartilhada e corresponsável.
 - e** Organização em rede referenciada a um território sanitário; Padrões de segurança e qualidade; Gestão sistêmica, compartilhada e corresponsável; Financiamento por procedimentos; Atenção integral, orientada às necessidades de saúde e centrada no cuidado multiprofissional.
- 28.** Sobre Sistematização da Assistência de Enfermagem - SAE - e Processo de Enfermagem - PE, relacione as colunas colocando **(A)** para Sistematização da Assistência de Enfermagem - **SAE** e **(B)** para Processo de Enfermagem - **PE**.
- Formas de organizar a assistência.
 - Principal método de abordagem clínica.
 - Possui cinco etapas inter-relacionadas e interdependentes.
 - Procedimento Operacional Padrão (POP).
 - Check List.
 - Dimensionamento de Pessoal em Enfermagem (Escala).
 - Protocolos.
 - O Diagnóstico de Enfermagem e Planejamento são privativos do enfermeiro.
- A alternativa que corresponde a sequência correta de cima para baixo é:
- a** A, B, B, A, A, A, A, B
 - b** A, A, B, A, B, A, A, A
 - c** B, B, B, A, A, B, A, A
 - d** B, A, B, A, A, A, A, B
 - e** A, B, B, A, A, A, B, A
- 29.** O mundo interconectado e com grande circulação de pessoas e produtos, contribuiu para o acelerado espalhamento do novo Coronavírus (SARS-CoV-2). A pandemia da Covid-19 continua sendo um desafio para a saúde global, neste sentido, em razão da necessidade de isolamento aéreo, durante o pico inicial da pandemia houve falta de um item fundamental na biossegurança na assistência – as máscaras de uso profissional com eficácia mínima na filtração de 95% de partículas de até 0,3 μ . No âmbito da assistência ambulatorial ou hospitalar à pessoa suspeita ou confirmada para Covid-19, as máscaras recomendadas pela Agência de Vigilância Sanitária (ANVISA) para a garantia da precaução para aerossóis são:
- a** máscara cirúrgica, N95 e N99
 - b** N95, N99 e PPF1
 - c** N95, N99 e PPF2
 - d** N95 e PPF1
 - e** PPF1 e PPF2

- 30.** Com base nos resultados de baciloscopia de escarro, Teste Rápido Molecular para Tuberculose (TRM-TB), Prova Tuberculina (PT) e Raio-X, de acordo com o Ministério da Saúde o enfermeiro inicia o tratamento com o Esquema Básico (2RHZE/4RH) para tuberculose (TB) de caso novo ou retratamento nos casos de:
- Tuberculose pulmonar com baciloscopia positiva ou TRM-TB positivo sem resistência à rifampicina.
 - Tuberculose pulmonar com baciloscopia positiva ou TRM-TB positivo com resistência à rifampicina.
 - Raio-X laudado como sugestivo para TB e Prova Tuberculínica reativa.
 - TRM-TB positivo com resistência à rifampicina e raio-X laudado como sugestivo para TB.
 - TRM-TB positivo sem resistência à rifampicina e raio-X laudado como sugestivo para TB.
- 31.** Independentemente da classificação operacional do caso notificado – paucibacilar (PB) ou multibacilar (MB) os contatos domiciliares e sociais devem ser acompanhados uma vez ano por 5 anos, quando na avaliação inicial estes não foram identificados como casos de hanseníase. Sobre contatos de caso índice de hanseníase, é correto afirmar que:
- Deve-se realizar a anamnese dirigida aos sinais e sintomas da hanseníase, exame dermatoneurológico.
 - Deve-se realizar a vacinação BCG para os contatos com presença de sinais e sintoma de hanseníase.
 - Deve-se realizar a vacinação BCG para os contatos sem presença de sinais e sintoma de hanseníase.
 - Contato social é toda e qualquer pessoa que conviva ou tenha convivido em relações sociais (familiares ou não), de forma próxima e prolongada com o caso notificado.
- A alternativa que contém todas as afirmativas corretas é:
- I, II e III
 - I, III e IV
 - I, II, III e IV
 - I e IV
 - II e III
- 32.** Sobre medidas de prevenção e controle de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) e o HIV/ AIDS relacione os métodos a sua respectiva definição:
- Prevenção combinada.
 - Profilaxia Pós-Exposição ao HIV – PEP.
 - Profilaxia Pré-Exposição ao HIV – PreP.
 - Preservativo.
- () Método de prevenção à infecção pelo HIV que consiste na tomada diária de um comprimido que impede que o vírus causador da aids infecte o organismo, antes de a pessoa ter contato com o vírus.
- () Associa diferentes métodos de prevenção ao HIV, às IST e às hepatites virais.
- () Método de barreira.
- () Tomada de medicamentos como medida de prevenção de urgência à infecção pelo HIV, hepatites virais e outras infecções sexualmente transmissíveis (IST).
- A alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo é:
- I, II, III e IV
 - II, I, IV e III
 - III, I, IV e II
 - III, I, II e IV
 - IV, I, II e III
- 33.** A Portaria nº 2.436/2017 do Ministério da Saúde, normatiza a Política Nacional da Atenção Básica (PNAB) e desta forma aponta que a Estratégia Saúde da Família (ESF) deve ser a forma de oferta e expansão da atenção à saúde de forma prioritária no Brasil. Sobre a Estratégia Saúde da Família, é correto afirmar que:
- A Estratégia Saúde da Família é ponta da Rede de Atenção à Saúde.
 - A Estratégia Saúde da Família é a base e o centro da Rede de Atenção à Saúde.
 - São tipos de Estratégia Saúde da Família: ESF, ESFR, ESFF, eSB, eAP, eABP e CR.
 - A Estratégia Saúde da Família deve ser a principal porta de entrada e vínculo principal na Rede de Atenção à Saúde.
- A alternativa que contém todas as afirmativas corretas é:
- I, II, III e IV
 - I, III e IV
 - II, III e IV
 - II e IV
 - I e III

34. Sobre os exames laboratoriais para detecção da infecção pelo SARS-CoV-2, relacione os conceitos da primeira coluna com sua respectiva definição na segunda.

- I. IgM
- II. IgG
- III. RT-PCR
- IV. Sorologia quantitativa
- () Melhor marcador de identificação do início da infecção.
- () Exame imunológico em geral reagente entre o 7º e 21º dia após o início da infecção.
- () Solicitado após o 7º dia para identificação da reação dos anticorpos IgA e IgM, IgM e IgG, anticorpos totais e somente IgG após o 19º dia do início da infecção.
- () Exame imunológico em geral reagente após o 14º dia do início da infecção.

A alternativa que corresponde a sequência correta de cima para baixo é:

- a** II, I, III e IV
- b** II, I, IV e III
- c** III, I, IV e II
- d** III, II, IV e I
- e** IV, I, III e II

35. No contexto do pico da pandemia da Covid-19, ocorreu em vários países sobrecarga dos serviços de saúde e os profissionais muitas vezes tiveram que realizar tristes e dolorosas escolhas como para quem seriam instalados os ventiladores mecânicos disponíveis, muitas vezes idosos e pessoas com graus de deficiência ficaram sem esta assistência ventilatória. Adicionalmente, notou-se que para populações tradicionais foram negligenciadas políticas de apoio para o enfrentamento e prevenção da pandemia. Neste contexto, relacione os conceitos da primeira coluna com sua respectiva definição na segunda coluna.

- I. Ageísmo
- II. Capacitismo
- III. Genocídio
- IV. Negacionismo
- () Iniciativas diretas ou negligências voltada a uma população ou parte dela que impacte em seu extermínio total ou parcial.
- () Discriminação geracional, principalmente voltada às pessoas mais velhas.
- () Postura de governos que desacreditaram na presença da doença e com isso a doença avançava em termos de mais doentes e mortos.
- () Discriminação, negligência contra pessoas com alguma deficiência.

A alternativa que corresponde a sequência correta de cima para baixo é:

- a** I, II, III e IV
- b** II, III, IV e I
- c** III, I, IV e II
- d** IV, I, III e II
- e** IV, I, II e III

36. Sobre os parâmetros ideais de sinais vitais para a pessoa adulta em repouso, relacione o sinal vital da primeira coluna com seu respectivo parâmetro na segunda coluna.

- I. Temperatura axilar – Tax em ° C
- II. Pulso – P em bpm
- III. Frequência respiratória – R em irpm
- IV. Pressão Arterial – PA em mm Hg
- V. Saturação de Oxigênio – SpO₂ em %
- () 12 a 18
- () <140/ <90
- () 50 a 100
- () 95 a 100
- () 60 a 100

A alternativa que corresponde a sequência correta de cima para baixo é:

- a** III, II, I, IV e V
- b** II, I, III, V e IV
- c** I, II, III, IV e V
- d** V, IV, I, III e II
- e** III, IV, I, V e II

37. Correspondem somente as vias parenterais de administração de medicamentos:

- I. Via oral (VO)
- II. Via intramuscular (IM)
- III. Via Subcutânea (SC)
- IV. Hipodermóclise
- V. Proctóclise

A alternativa que contém todas as afirmativas corretas é:

- a** I, II e V
- b** II, III e IV
- c** III, IV e V
- d** IV e V
- e** I e V

38. O Cuidado Paliativo é uma filosofia de cuidados que orienta uma abordagem que busca a qualidade de vida e alívio/ conforto do sofrimento humano de pessoas com agravos que ameaçam a continuidade da vida e apoio às suas famílias e cuidadores. Neste sentido, o Cuidado Paliativo também visa uma morte com dignidade. Sobre as abordagens da Tanatologia relacione os conceitos à sua definição nas colunas abaixo.

- I. Eutanásia
- II. Distanásia
- III. Mistanásia
- IV. Ortotanásia
- V. Kalotanásia

- () O prolongamento do processo de morrer à custa de sofrimento na perspectiva do paciente.
- () Morte infligida pelas três esferas de governo por meio da manutenção da pobreza, da violência, das drogas, da falta de infraestrutura e das condições mínimas para a vida digna.
- () Ato cometido por terceiro para antecipar a morte e cessar o sofrimento do paciente.
- () Agrega aspectos culturais e estéticos à morte, enfatizando a participação ativa de quem está morrendo, com inclusão de valores importantes para o paciente.
- () Traduz a morte desejável, natural, no tempo certo, na qual não há interferência humana para o prolongamento artificial da vida ou para o adiantamento intencional da morte.

A alternativa que corresponde a sequência correta de cima para baixo é:

- a** I, III, II, IV e V
- b** II, III, I, V e IV
- c** II, V, I, IV e III
- d** III, I, V, IV e II
- e** III, I, V, II e IV

39. O planejamento em saúde pode ser compreendido como um processo que consiste em elaborar uma análise da realidade, definir proposições, construir sua viabilidade, com o objetivo de resolver problemas e necessidades individuais e coletivas (CUNHA, 2017). Considerando o planejamento na rotina da equipe da Estratégia Saúde da Família, assinale a alternativa correta.

- a** O planejamento no Sistema Único de Saúde deve ser realizado de modo ascendente e centralizado.
 - b** O planejamento na saúde permite a qualificação da gestão e da atenção aos usuários.
 - c** O planejamento é uma atribuição exclusiva dos profissionais de nível superior na equipe.
 - d** A comunidade não precisa participar do planejamento da equipe, visto que só deve participar do planejamento quem é responsável pela execução.
 - e** O método para planejamento das equipes da atenção básica é o planejamento estratégico situacional.
- 40.** Território é a unidade geográfica única, onde serão realizadas ações estratégicas destinadas à vigilância, promoção, prevenção, proteção e recuperação da saúde (BRASIL, 2017). De acordo com o conceito de território e territorialização descritos na Política Nacional de Atenção Básica, assinale a alternativa correta.
- a** Área de abrangência e área de influência são as mesmas áreas.
 - b** O processo de territorialização é atribuição exclusiva do agente comunitário de saúde.
 - c** Os territórios são destinados para dinamizar as ações em saúde, permitindo conhecer melhor a realidade e subsidiar a atuação da equipe de saúde.
 - d** A municipalização da gestão da atenção básica foi responsável pela ampliação das redes de atenção à saúde.
 - e** A visita domiciliar é a ferramenta que se utiliza para realizar a territorialização.

- 41.** O processo da construção social da Atenção Primária à Saúde (APS) se propõe ser entendido por meio de uma metáfora da construção de uma casa. Utilizando-se da metáfora de construção da casa na APS relacione as colunas e assinale a alternativa com a sequência correta.
- I. Parede da casa
 - II. Teto da casa
 - III. Laje da casa
 - IV. Porta
 - V. Janela
- () Macroprocesso de Atenção Preventiva
 () Macroprocesso de Atenção Domiciliar
 () Macroprocesso de Atenção ao Evento Agudo
 () Macroprocesso de Demandas Administrativas
 () Macroprocesso de Cuidados Paliativos
- A alternativa que corresponde a sequência correta de cima para baixo é:
- a III, IV, I, II, V
 - b I, II, III, IV, V
 - c V, II, I, IV, III
 - d III, IV, II, I, V
 - e IV, V, III, I, II
- 42.** A forma de transmissão é o elemento mais importante na cadeia epidemiológica, uma vez que é o elo mais passível da quebra ou interrupção. As medidas de precaução e isolamento visam interromper estes mecanismos de transmissão e prevenir infecções. Em relação aos tipos de precauções específicas, quanto ao modo de transmissão, associe as colunas abaixo.
1. Precauções por gotículas
 2. Precauções por contato
 3. Precauções por aerossóis
- () Diarreia em paciente com incontinência
 () Caxumba
 () Meningite meningocócica
 () Tuberculose pulmonar
 () Microorganismo multirresistente
 () Varicela
- A alternativa que contém a sequência correta de cima para baixo é:
- a 3, 2, 1, 1, 2, 3
 - b 2, 1, 1, 2, 3, 3
 - c 1, 3, 2, 3, 2, 1
 - d 2, 3, 1, 1, 2, 3
 - e 2, 1, 1, 3, 2, 3
- 43.** O médico assumiu o plantão às 7h da manhã, ao passar visita no seguinte paciente, prescreveu: 1000 ml de solução glicosada 5% adicionada de 20 ml de KCl a 15% e 10 ml de NaCl 10%, a ser infundida via endovenosa em 8 horas. E solicita a equipe de enfermagem o volume infundido após 5 horas, o gotejamento da infusão é de controle manual em gotas por minuto e a bomba de infusão em ml/h. Assinale a alternativa que apresenta o volume infundido, o gotejamento e a velocidade da infusão.
- a 1030 ml; 42,9 gotas/minuto; 128,75 ml/h.
 - b 650 ml; 41,6 gotas/minutos; 125 ml/h.
 - c 1000ml; 42,9 gotas/minutos; 128,75 ml/h.
 - d 643,75 ml; 42,9 gotas/minuto; 128,75 ml/h
 - e 1030 ml; 41,6 gotas/minuto; 125 ml/h.
- 44.** A Resolução COFEN Nº 567/2018, considera que o enfermeiro tem autonomia quanto aos cuidados com pacientes com feridas, respeitadas as competências éticas e legais. Neste sentido sabemos que nas últimas décadas ocorreram avanços tanto no conhecimento, quanto nas técnicas e nos produtos relacionados ao processo cicatricial e aos tipos de curativos. Diante do exposto, analise as afirmativas abaixo.
- I. O alginato de cálcio é uma fibra impregnada de alginato de cálcio e sódio, que quando entra em contato com o exsudato ou sangue, forma um gel fibrinoso.
 - II. O carvão ativado com prata é indicado para feridas contaminadas, pouco exsudativas, profundas e sem odor.
 - III. O hidrogel é indicado para feridas exsudativas, pois estimula o debridamento autolítico e controle do exsudato.
 - IV. O curativo úmido protege as terminações nervosas superficiais, reduz a dor e acelera o processo de cicatrização.
 - V. O hidrocoloide é composto por carboximetil celulose sódica, gelatina e pectina em sua camada interna, e espuma de poliuretano na camada externa.
- A alternativa que contém todas as afirmativas corretas é:
- a I, II e III
 - b II, III e V
 - c III, IV e V
 - d I, IV e V
 - e I, II, III, IV e V

45. A Bioética tem como objetivo facilitar o enfrentamento de questões éticas/bioéticas que surgirão na vida profissional. Sem esses conceitos básicos, dificilmente um profissional conseguiria enfrentar um dilema, um conflito, e se posicionar diante dele de maneira ética. Considerando os princípios da bioética, assinale a alternativa correta.

- a) O princípio da beneficência diz respeito a reduzir o mal, ou seja, oferecer o tratamento de modo a não produzir riscos ao paciente.
- b) A justiça compreende que as pessoas tem liberdade de decisão sobre sua vida, logo, cabe a ela escolher e gerenciar sua vontade.
- c) O princípio que se refere à igualdade de tratamento e a distribuição de serviços de saúde onde se mais necessita é o princípio da equidade.
- d) A autonomia deve levar em consideração duas condições fundamentais, a liberdade e a informação.
- e) O início da Bioética se deu na segunda guerra mundial, visto que foi nesse período que surgiram os princípios.

46. Considerando que a enfermagem é comprometida com a produção e gestão do cuidado prestado nos diferentes contextos socioambientais e culturais em resposta às necessidades da pessoa, família e comunidades. Julgue as afirmativas a seguir em verdadeiras (V) e falsas (F):


- () O profissional de enfermagem atua com autonomia, de acordo com os preceitos éticos e legais.
- () É direito do profissional de enfermagem, negar-se a ser filmado, fotografado e exposto em mídias sociais durante o desempenho de suas atividades profissionais.
- () A advertência consiste no pagamento de 01 (um) a 10 (dez) vezes o valor da anuidade.
- () As infrações são consideradas leves, moderadas, graves e gravíssimas.
- () É considerada infração grave a que provoca morte, debilidade permanente de membro, sentido ou função, dano moral irremediável na pessoa.

A alternativa que contém a sequência correta de cima para baixo é:

- a) V, V, F, V, F
- b) V, V, V, F, F
- c) F, F, V, F, F
- d) F, V, F, V, F
- e) V, F, F, V, V

47. A influenza é uma infecção viral aguda que afeta o sistema respiratório. É de elevada transmissibilidade e distribuição global, com tendência a se disseminar facilmente em epidemias sazonais e também pode causar pandemias. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), estima-se que a ocorrência de casos da influenza varia de leve a grave e pode levar ao óbito. A hospitalização e morte ocorrem principalmente entre os grupos de alto risco. Todos os anos o Ministério da Saúde realiza uma campanha de vacinação contra a influenza, no entanto, conforme os dados do próprio Ministério da Saúde a cobertura vacinal vem decrescendo ao longo dos anos. Analise o gráfico abaixo e assinale a alternativa correta.

Campanha Nacional de Vacinação Contra Influenza 2019
VACINOMETRO



População	1.671.531
Doses Aplicadas	1.534.583
Cobertura Vacinal	91,81%
População Alvo	Todos
Região	Norte
Nível	MACRO REGIONAL
UF	15 – Pará
Macro Regional	33 – MR - PA

Fonte: SIPNI / DATASUS/MS

- a) O estado do Pará está abaixo da meta nacional que é imunizar pelo menos 95% de cada um dos grupos prioritários.
- b) O objetivo da campanha é reduzir os desperdícios de doses, as complicações, as internações decorrentes das infecções pelo vírus da influenza, na população alvo para a vacinação, por isso a campanha é organizada em fases.
- c) Quando consideramos a população a ser vacinada percebemos que mesmo tendo uma cobertura maior que 90% ainda há muitas pessoas dos grupos prioritários que não foram imunizadas.
- d) O Pará está acima da meta nacional que é imunizar 90% de cada um dos grupos prioritários, não possuindo necessidade de ampliação dessa cobertura.
- e) Pessoas com imunossupressão por doenças ou medicamentos não devem receber a vacina pois podem acabar desenvolvendo o quadro grave da doença.

- 48.** Considerando o período de pandemia devido ao Covid-19, e a elevada quantidade de notícias falsas relacionadas ao tema. O Ministério da Saúde está disponibilizando em seu site um link para combater as Fake News sobre saúde, sendo um espaço exclusivo para receber informações virais, que serão apuradas pelas áreas técnicas e respondidas oficialmente se são verdade ou mentira. Sobre a importância na veracidade das informações em saúde, assinale a alternativa correta.
- a** O fenômeno de divulgação de notícias falsas não tem elevado impacto no entendimento da população, visto que o alcance é reduzido.
 - b** A principal motivação para a redução da cobertura vacinal no Brasil está diretamente associada a divulgação de *Fake News* sobre os imunobiológicos.
 - c** O marco legal da internet penaliza somente quem elabora *Fake News*, visto que quem divulga não tem como saber se a informação é verdadeira ou não.
 - d** O impacto na divulgação de informações falsas é altamente nocivo para a saúde pública, visto que dificulta o processo responsável de divulgação de informações relevantes à saúde.
 - e** Antes da pandemia não se via episódios de divulgação de informações falsas com conteúdo voltados à saúde pública.
- 49.** As Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) são a causa principal de mortalidade e de incapacidade prematura na maioria dos países de nosso continente, incluindo o Brasil. Este fenômeno, chamado de "transição epidemiológica", ocorre devido à mudança do padrão de mortalidade que afeta a população. Acerca deste assunto assinale a alternativa correta.
- a** O câncer e as doenças respiratórias são as que possuem maior impacto na saúde pública, pois demandam alta densidade tecnológica para acompanhamento e tratamento.
 - b** A estratégia orienta que a abordagem das DCNT e seus fatores de risco associados deve ter abrangência intersetorial.
 - c** O plano de ações estratégicas para o enfrentamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) no Brasil se concentra no enfrentamento do acidente vascular cerebral, infarto e hipertensão arterial.
 - d** A Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS) tem priorizado diversas ações no campo da alimentação saudável, atividade física, portanto se concentra apenas no enfrentamento de doenças como diabetes e hipertensão arterial sistêmica.
 - e** As DCNT tem elevada incidência mundial, mas não chega a assumir um caráter relevante para a saúde pública.
- 50.** A notificação é obrigatória no caso de sífilis adquirida, sífilis em gestante, sífilis congênita, hepatites virais B e C, AIDS, infecção pelo HIV, infecção pelo HIV em gestante, parturiente ou puérpera e criança exposta ao risco de transmissão vertical do HIV (BRASIL, 2015). Considerando o protocolo clínico e diretrizes terapêuticas para atenção integral às pessoas com infecções sexualmente transmissíveis, julgue as afirmativas abaixo em Verdadeiras (V) e Falsas (F):
- Considera-se tratamento inadequado da gestante com sífilis o tratamento incompleto, mesmo tendo sido feito com penicilina benzatina.
 - Considera-se cura quando o(s) parceiro(s) sexual(is) com sífilis são tratado(s).
 - Considera-se um caso de sífilis congênita a gestante com teste treponêmico reagente e teste não treponêmico não reagente ou não realizado, sem registro de tratamento prévio
 - É atribuição da atenção primária a saúde referir os casos de dor pélvica com sangramento vaginal, casos com indicação de avaliação cirúrgica ou quadros mais graves para unidades com ginecologista e/ou que disponham de atendimento cirúrgico.
 - Considera-se tratamento inadequado o caso de parceiro(s) sexual(is) com sífilis sintomática ou com testes imunológicos positivos não tratado(s) ou tratado(s) inadequadamente.
- A alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo, é.
- a** F, V, V, F, F
 - b** F, V, F, V, F
 - c** V, V, F, V, F
 - d** F, F, F, V, V
 - e** V, F, F, V, V



UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ
PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE - 2021
Categoria Profissional: Enfermagem

GABARITO DO CANDIDATO

O gabarito poderá ser copiado, **SOMENTE**, no espelho constante no final do boletim de questões disponibilizado para este fim que somente será destacado no final de sua prova, pelo fiscal de sua sala.

QUESTÃO	ALTERNATIVA	QUESTÃO	ALTERNATIVA
1		26	
2		27	
3		28	
4		29	
5		30	
6		31	
7		32	
8		33	
9		34	
10		35	
11		36	
12		37	
13		38	
14		39	
15		40	
16		41	
17		42	
18		43	
19		44	
20		45	
21		46	
22		47	
23		48	
24		49	
25		50	