

1. A integralidade, como princípio do Sistema Único de Saúde (SUS), está fortemente associada à/ao(s):
 - a) rede assistencial.
 - b) trabalho em equipe.
 - c) marcos organizativos.
 - d) atenção primária em saúde.
 - e) marcos doutrinários.
2. A Política Nacional da Atenção Básica está, prioritariamente, organizada a partir da:
 - a) humanização do atendimento.
 - b) rede de serviços assistenciais.
 - c) educação permanente.
 - d) estratégia saúde da família.
 - e) linha de cuidado.
3. A coordenação, articulação, planejamento, controle, avaliação e auditoria dos Sistemas de Saúde Estaduais e Municipais são condições essenciais para:
 - a) o atendimento das diretrizes constitucionais.
 - b) a Resolubilidade da atenção à saúde na perspectiva da assistência integral como princípio do Sistema Único de Saúde-SUS.
 - c) a Gestão eficiente e eficaz para o controle do funcionamento do Sistema Único de Saúde-SUS.
 - d) a segurança dos usuários dos serviços considerando as condições de organização e funcionamento do Sistema Único de Saúde-SUS.
 - e) o pleno funcionamento do sistema de informação das ações e atividades desenvolvidas pelos serviços de saúde do Sistema Único de Saúde-SUS.
4. Os fundamentos e principais atributos da rede de atenção à saúde corresponde a:
 - a) integração horizontal dos serviços.
 - b) estratégia para a articulação dos serviços de saúde.
 - c) descentralização da gestão.
 - d) universalização do cuidado.
 - e) integralidade.
5. A pandemia do Coronavírus em curso, ainda exige análises conjunturais e epidemiológicas para a mitigação do processo de transmissão e a adoção de estratégias assistenciais na perspectiva da redução do agravo às populações exigindo que vários fatores sejam levados em consideração em um cenário incerto. Dentre eles releva-se:
 - a) as características locais, sociais e demográficas.
 - b) a capacidade da gestão local.
 - c) as descobertas farmacológicas.
 - d) diferenças culturais.
 - e) as características socioeconômicas.
6. Em tempos de pandemia, o mecanismo mais eficaz para avaliar as possibilidades de isolamento domiciliar das pessoas suspeitas de diagnóstico da Covid-19, pelo agente comunitário de saúde, na sua área de atuação é a vigilância:
 - a) sanitária
 - b) passiva
 - c) ativa
 - d) da saúde
 - e) na saúde
7. Nas Redes de Atenção a Saúde são características das Linhas de Cuidado:
 - a) os cuidados assistenciais prestados de forma estruturada por nível de complexidade dos serviços de saúde.
 - b) um *continuum* assistencial composto por ações de promoção, prevenção, tratamento e reabilitação.
 - c) os níveis organizativos das ações da promoção a reabilitação da saúde.
 - d) os serviços de prestação da assistência da promoção a reabilitação da saúde.
 - e) um *continuum* organizacional composto por ações de promoção, prevenção, tratamento e reabilitação.
8. A condição crônica se caracteriza, fundamentalmente, por ser tudo aquilo que está associada aos:
 - a) casos de doenças de cunho social e assistencial a serem atendidos pelo sistema de saúde.
 - b) casos que exigem uma resposta social deliberada por parte do sistema de saúde.
 - c) pacientes idosos com vulnerabilidade social.
 - d) pacientes portadores de doenças crônicas que exigem a atenção integral e intersetorial.
 - e) cidadãos e cidadãs vulneráveis social e economicamente.
9. Uma das funções da equipe de saúde nas condições crônicas é:
 - a) apoiar tecnicamente os portadores de doenças crônicas.
 - b) identificar os fatores proximais das condições de saúde da área.
 - c) encaminhar aos especialistas no campo assistencial e social.
 - d) apoiar as pessoas para o autocuidado.
 - e) identificar a capacidade de respostas do sistema de saúde.

- 10.** A nova forma de financiamento, pelo Ministério da Saúde, das ações da Atenção Primária em Saúde desenvolvidas nos municípios é denominada de Programa:
- a** Nacional de Atenção Básica.
 - b** Previne Brasil.
 - c** Saúde da Família.
 - d** Nacional de Melhoria da Qualidade.
 - e** Avança Brasil.
- 11.** A interprofissionalidade e a autonomia são características do(a):
- a** organização da rede de serviços de saúde.
 - b** processo de trabalho em saúde.
 - c** linha de cuidado assistencial hierarquizada.
 - d** princípio da integralidade ou atenção integral.
 - e** educação permanente.
- 12.** Para receberem os recursos financeiros com base nas novas formas de financiamento os municípios precisam, fundamentalmente, alcançar:
- a** eficiência.
 - b** eficácia.
 - c** produtividade.
 - d** objetivos definidos pelas Secretarias Municipais de Saúde.
 - e** indicadores de desempenho satisfatórios.
- 13.** Um dos principais focos das diretrizes para segurança do paciente é:
- a** o profissional de saúde.
 - b** o usuário do serviço de saúde.
 - c** a participação do paciente.
 - d** o envolvimento do gestor.
 - e** estrutura física dos serviços e equipe de saúde.
- 14.** O atual modelo de financiamento da Atenção Primária em Saúde é formado:
- a** pela captação ponderada, pagamento por desempenho e por incentivos a estratégias e programas.
 - b** pelo piso nacional de atenção básica fixo e variável e captação ponderada e pagamento por desempenho.
 - c** pelo Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica, pelo piso nacional de atenção básica e por incentivos a estratégias programadas.
 - d** pela Estratégia Saúde da Família, Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da atenção básica e pelo piso nacional de Atenção Básica.
 - e** Pelo incentivo a estratégias e Programas e Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica.
- 15.** O fator essencial na definição de diretrizes para a segurança do paciente é:
- a** experiência profissional.
 - b** proatividade profissional.
 - c** cultura organizacional e sistema de aprendizado.
 - d** identificação das causas dos erros cognitivos.
 - e** compromisso institucional.
- 16.** Mulher de 57 anos é hipertensa e faz uso de hidroclorotiazida, prescrita para a pressão arterial elevada. Ela refere dores nas pernas e o médico decide mudar a medicação para espirolactona e losartana. A mudança para esse diurético é feita para:
- a** reduzir hiperuricemia.
 - b** bloquear canais de cálcio.
 - c** diminuir a perda de sódio.
 - d** reduzir a perda de potássio.
 - e** inibir a enzima conversora de angiotensina.
- 17.** Paciente com Covid-19 adquiriu pneumonia nosocomial, após ser submetido à ventilação mecânica. Suspeita-se que a infecção secundária seja provocada pelo *Staphylococcus aureus* resistente à metilicina. Deste modo é administrada a vancomicina, a qual precisa ser administrada com velocidade de infusão intravenosa de forma lenta, para evitar o efeito adverso:
- a** Síndrome do homem vermelho.
 - b** Nefrotoxicidade.
 - c** Ototoxicidade.
 - d** Síndrome do bebê cinzento.
 - e** Hepatotoxicidade.
- 18.** Um homem foi levado ao pronto-socorro em condição grave após ingerir um líquido de um frasco não rotulado. Ele apresentou diarreia, micção frequente, convulsões, dificuldade respiratória, miose e salivação excessiva. Ao ser internado foi administrado tratamento para intoxicação por organofosforado. O tratamento de escolha para essa intoxicação é:
- a** Neostigmina.
 - b** Acetilcolina.
 - c** Malation.
 - d** Pancurônio.
 - e** Atropina.

- 19.** Um dos principais tratamentos preventivos para as formas de asma são os glicocorticoides. Para o tratamento dessa enfermidade são escolhidas as formas inalatórias, como é o caso da budesonida, em detrimento das drogas de uso oral. Os corticosteroides inalatórios são os medicamentos de escolha para o tratamento da asma:
- a** devido aos efeitos sistêmicos exacerbados.
 - b** devido a inibição da ciclooxigenase.
 - c** por induzirem concentrações menores no sistema respiratório.
 - d** por provocarem concentrações locais mais altas na via respiratória, com redução de efeitos sistêmicos.
 - e** por atuarem diretamente nos receptores Beta-2 adrenérgicos.
- 20.** Paciente hipertenso faz uso de captopril há um ano. Ao jogar futebol se machucou e precisou fazer uso de cetoprofeno. Ao iniciar o antiinflamatório não esteroideal percebeu que a sua pressão arterial descontrolou. Sobre o aumento da pressão arterial deste paciente, é correto afirmar que:
- a** o cetoprofeno não interfere na ação do captopril.
 - b** o cetoprofeno inibe a síntese de prostaglandina renal, causando o aumento da retenção de fluidos orgânicos e de sódio.
 - c** o cetoprofeno ao induzir a síntese de prostaglandina, aumenta a pressão arterial.
 - d** o cetoprofeno ao inibir a ciclooxigenase, diminui a pressão arterial.
 - e** o cetoprofeno inibe a ciclooxigenase, causando diminuição da retenção de fluidos.
- 21.** Em relação à dispensação de medicamentos, é correto afirmar que:
- a** o farmacêutico verificará de forma sistemática se o paciente conhece o objetivo do tratamento, a forma de administração do medicamento e se o mesmo não é inadequado para aquele paciente, considerando as informações disponíveis no momento.
 - b** o farmacêutico não precisa estar identificado.
 - c** a formação continuada ministrada pelo farmacêutico aos técnicos é dispensável.
 - d** deve-se evitar a intervenção na prescrição como troca por medicamento genérico.
 - e** o farmacêutico deve apenas orientar o paciente sobre o uso do medicamento, evitando orientação a terceiros.
- 22.** Maria é hipertensa e recentemente sofreu um infarto agudo do miocárdio. Para o pós-infarto foi prescrito o atenolol. Sobre a indicação do atenolol, neste caso, é correto afirmar que:
- a** o atenolol aumenta os níveis de bradicinina, um potente vasodilatador.
 - b** o atenolol por ser agonista beta-2 adrenérgico, reduz a pressão arterial.
 - c** o atenolol reduz os batimentos cardíacos por ser antagonista não seletivos dos receptores beta adrenérgicos.
 - d** o atenolol aumenta a força de contração cardíaca.
 - e** o atenolol reduz o esforço cardíaco, diminuindo a possibilidade de um novo infarto.
- 23.** Homem de 50 anos deu entrada no hospital com um quadro de angina instável. Foi prescrito nitroglicerina por via sublingual. Antes da administração do vasodilatador, o paciente relatou que fez uso de sildenafil. Deste modo interromperam a administração de nitroglicerina devido à possibilidade de hipotensão grave. A consequência da interação farmacodinâmica pela co-administração de nitroglicerina e sildenafil é:
- a** as duas drogas competem pela albumina plasmática, causando o risco de hipotensão grave.
 - b** a co-administração reduz a meia vida da nitroglicerina pela metabolização no citocromo P-450.
 - c** a co-exposição a esses dois fármacos aumenta o cGMP em grau ainda maior, aumentando o risco de hipotensão grave.
 - d** a interação entre as duas drogas diminui o cGMP, aumentando o risco de hipertensão.
 - e** a co-exposição inibe a absorção de nitroglicerina.
- 24.** Paciente de 22 anos fez uso de paracetamol por uma semana, após prescrição médica devido quadro de dengue. Apesar de ter tomado a medicação em doses terapêuticas, o paciente apresentou falência hepática e como consequência, foi submetido ao transplante de fígado. O principal metabólito tóxico responsável por esses efeitos é:
- a** Glutathiona
 - b** Imina de n-acetil-p-benzoquinona
 - c** Acetilcisteína
 - d** Citocromo-P450
 - e** Álcool

25. Em relação ao ciclo de assistência farmacêutica, o objetivo da programação de medicamentos é:
- a) garantir a disponibilidade dos medicamentos previamente selecionados nas quantidades adequadas e no tempo oportuno para atender as necessidades da população.
 - b) caracterizado por um conjunto de procedimentos técnicos e administrativos que envolvem as atividades de recebimento, estocagem, segurança e conservação dos medicamentos, bem como o controle de estoque.
 - c) garantir a entrega do medicamento correto ao usuário, na dose e quantidade prescrita.
 - d) disponibilizar os medicamentos em quantidade, qualidade e menor custo/efetividade, visando manter a regularidade e funcionamento do sistema.
 - e) garantir o acondicionamento do medicamento, de modo a assegurar a qualidade do produto.
26. Em relação aos padrões Mínimos para Farmácia Hospitalar, sobre a infraestrutura necessária ao funcionamento no que tange ao espaço para o farmacêutico executar as suas funções, **NÃO** está incluso:
- a) a implantação e manutenção de sistemas de arquivo.
 - b) disponibilidade de salas para prática de atividades farmacêuticas, respeitando suas necessidades técnicas.
 - c) disponibilidade de serviços de manutenção, para assegurar o pleno funcionamento das tecnologias disponíveis e instalações físicas.
 - d) implantação de um sistema de gestão informatizado.
 - e) criação de um perfil farmacoterapêutico para pacientes hospitalares.
27. O medicamento Anidulafungina compõe-se de um anel de seis aminoácidos ligados a uma cadeia lateral lipofílica e pertence à classe:
- a) aminoglicosídeo.
 - b) quinolona.
 - c) cefalosporina.
 - d) equinocandina.
 - e) inibidor da DNA-polimerase.
28. Os receptores abaixo são responsáveis pela maioria dos efeitos analgésicos opióides e por alguns dos principais efeitos adversos. Dentre eles, assinale a alternativa que indica o receptor de maior relevância para a atividade terapêutica e efeitos adversos.
- a) σ
 - b) Muscarínico
 - c) μ
 - d) OLR
 - e) κ
29. O medicamento muito utilizado na terapêutica da depressão que atua como inibidor da captura da norepinefrina e 5-HT é:
- a) Mirtazapina.
 - b) Desvenlafaxina.
 - c) Paroxetina.
 - d) Moclobemida.
 - e) Trazodona.
30. Em um hospital terciário, um paciente evoluiu a óbito após a administração de Vancomicina por via endovenosa em bolus. Durante o processo de investigação, observou-se que na prescrição médica constava Vancomicina 2g EV 12/12h. Considerando todo o ciclo do medicamento dentro de um hospital até sua chegada ao paciente, é possível determinar como fator causal inicial para o erro de medicação:
- a) dispensação do medicamento.
 - b) administração do medicamento.
 - c) prescrição do medicamento.
 - d) recepção do medicamento.
 - e) aprazamento do medicamento.
31. A Fenitoína é um medicamento muito eficaz em muitas formas de epilepsia, exceto nas crises de ausência. Como mecanismo de ação deste medicamento, destaca-se:
- a) atuação principalmente por bloqueio uso-dependente dos canais de sódio.
 - b) fraca inibição da GABA transaminase.
 - c) bloqueio dos canais de cálcio do tipo T.
 - d) liberação de catecolaminas.
 - e) reforço à liberação de dopamina.
32. Interações medicamentosas que podem causar deterioração do status clínico do paciente, com ocorrência suspeitada, estabelecida ou provável em estudos controlados, considerando os riscos envolvidos é classificada como:
- a) Nível 2
 - b) Nível 4
 - c) Nível 1
 - d) Nível 5
 - e) Nível 3

33. Segundo a classificação de Wills & Brown, reações determinadas pelas propriedades químicas do fármaco ou excipiente e não pela atividade farmacológica, são classificadas como:

- a) Tipo C
- b) Tipo F
- c) Tipo B
- d) Tipo E
- e) Tipo A

34. Processo cujo objetivo é escolher dentre os medicamentos disponíveis no mercado, aqueles que atenderão com eficácia e segurança as necessidades de uma determinada população e fornece informações para sua prescrição, sempre com base em critérios científicos rigorosos é:

- a) programação.
- b) armazenamento.
- c) seleção.
- d) distribuição.
- e) aquisição.

35. O fármaco que interfere na mitose pela ligação com os microtúbulos fúngicos é:

- a) Fluconazol.
- b) Anfotericina B.
- c) Caspofungina.
- d) Griseofulvina.
- e) Itraconazol.

36. O medicamento antiinflamatório, comumente utilizado para o tratamento sintomático da artrite reumatóide e osteoartrite, de potencia moderada e fracamente seletivo para COX-2 é:

- a) Diclofenaco.
- b) Rofecoxibe.
- c) Etoricoxibe.
- d) Celecoxibe.
- e) Lumiracoxibe.

37. São fármacos que afetam a transmissão noradrenérgica, como antagonistas de receptores α -adrenérgicos:

- a) Dobutamina e Salbutamol.
- b) Tiramina e Efedrina.
- c) Prazosina e tansulosina.
- d) Fenilefrina e Clonidina.
- e) Terbutalina e Epinefrina.

38. A Penicilina G Benzatina pode ser de extrema importância no tratamento da infecção causada pelo *Treponema pallidum*. Deste modo, a via de administração recomendada para este medicamento é:

- a) oral.
- b) intramuscular.
- c) sublingual.
- d) intravenosa.
- e) retal.

Leia o texto abaixo para responder à questão 39

Texto

"Criança de 10 anos, previamente hígida, relata moleza no corpo e inicia quadro de espirros, coriza, evoluindo com febre. A mãe, identificando os sintomas gripais, opta por dar ao filho, prednisona e ácido acetilsalicílico, pois era o que tinha em casa. O menor começa a melhorar dos sintomas, mas no terceiro dia de uso dos medicamentos, evolui com forte cefaleia, episódios de êmese, desorientação e ocorrência de convulsão. Em atendimento de urgência, após controle do quadro, o médico assistente informa à genitora que suspendeu os medicamentos em uso e suspeita de reação adversa a medicamento. "

39. Após fazer a leitura do caso acima, marque a alternativa que corresponde à reação desenvolvida pela criança.

- a) Síndrome de Lyme.
- b) Síndrome de Reed.
- c) Síndrome de Reye.
- d) Síndrome extrapiramidal.
- e) Síndrome de West.

Leia o texto abaixo para responder à questão 40

Texto

"Adolescente, relata dor no ouvido esquerdo, com presença de secreção. É levada ao médico, que durante a anamnese é informado que a moça não possui histórico de doenças prévias ou uso crônico de medicamentos, faz alimentação balanceada e pratica esportes (natação). Considerando a atividade esportiva, ele avalia o ouvido, identificando padrão de infecção fúngica, estabelecendo diagnóstico de Otite Externa, tendo como provável agente patológico a *Candida sp.*"

40. Avaliando as informações descritas acima, marque a alternativa que corresponde ao tratamento antimicrobiano de escolha, com base no melhor nível de evidência clínica:
- a) Fluconazol 200mg VO em dose única ou 100mg VO por 3 a 5 dias.
 - b) Metronidazol EV 100mg por 3 a 5 dias.
 - c) Fluconazol 200mg EV por 7 dias.
 - d) Anfotericina 50mg EV por 5 dias.
 - e) Metronidazol EV 100mg por 7 dias.
41. Segundo a Portaria MS/GM nº 204, de 29 de janeiro de 2007, a Assistência Farmacêutica é dividida em Blocos, classificados de acordo com as especificidades de suas ações, que possuem recursos próprios, movimentados em contas específicas. Sobre os Blocos da Assistência Farmacêutica, é correto afirmar que:
- a) componente Básico lida com programas específicos para controle de endemias, tais como a tuberculose, a hanseníase, a malária, a leishmaniose, dentre outras doenças.
 - b) componente Básico organiza a estratégia de acesso a medicamentos no âmbito do SUS; para tratamento medicamentoso em nível ambulatorial, com linhas de cuidado definidas em Protocolos Clínicos e em Diretrizes Terapêuticas (Ex. Asma, Alzheimer, Parkinson).
 - c) componente Estratégico lida com medicamentos e insumos da Assistência Farmacêutica no âmbito da Atenção Básica em Saúde e daqueles relacionados a agravos e programas de saúde específicos.
 - d) componente Especializado lida com programas específicos para controle de endemias, tais como a tuberculose, a hanseníase, a malária, a leishmaniose, dentre outras doenças.
 - e) componente Básico lida com medicamentos e insumos da Assistência Farmacêutica no âmbito da Atenção Básica em Saúde e daqueles relacionados a agravos e programas de saúde específicos.

Leia o texto abaixo para responder à questão 42

Texto

"Paciente hipertenso, apresentando edema de membros inferiores, é indicado a fazer uso de furosemida, na tentativa de ajudar no controle da hipertensão e reduzir o edema. Devido a um processo inflamatório, recebe Cetoprofeno para redução dos sinais flogísticos."

42. Considerando que o paciente tomou a furosemida e o cetoprofeno em concomitância, espera-se que possa ocorrer:
- a) aumento do efeito anti-inflamatório do cetoprofeno.
 - b) redução do efeito anti-hipertensivo e diurético da furosemida.
 - c) redução do efeito anti-inflamatório do cetoprofeno.
 - d) aumento do efeito anti-hipertensivo e diurético da furosemida.
 - e) inativação da ação anti-inflamatória do cetoprofeno.

Leia o texto abaixo para responder à questão 43

Texto

"Paciente psiquiátrico, aparentando iniciar crise, manifestando sinais de confusão e agitação psicomotora, é atendido em serviço de urgência/emergência com administração de Haloperidol endovenoso. O mesmo aparenta iniciar controle da crise, porém evolui com tremor, excesso de salivação e hipercinesia. O médico assistente identifica o quadro como reação extrapiramidal e mantém o paciente em observação, para controle do quadro em caso de exacerbação."

43. Tendo em vista que a reação extrapiramidal é uma reação adversa a medicamento (RAM) muito comum em pacientes em uso de haloperidol, assinale a alternativa correta, quanto à classificação de Rawlins e Thompson dessa RAM:
- a) Reação do tipo B.
 - b) Reação do tipo C.
 - c) Reação do tipo F.
 - d) Reação do tipo A.
 - e) Reação do tipo E.
44. No Ciclo da Assistência Farmacêutica, a atividade de programação corresponde a diversos processos, dentre eles, o de classificação de itens de estoque de medicamentos. Identifique das alternativas abaixo, qual faz a correta relação entre a classificação e o ponto de vista contemplado.
- a) ABC: Essencialidade
 - b) PQR: Fornecedor
 - c) XYZ: Usuário
 - d) VEN: Econômico
 - e) 123: Processo Operacional

Leia o texto abaixo para responder à questão 45

Texto

"Adolescente com síndrome de ovário policístico, que apresentou quadro pneumônico, com falência de tratamento inicial com ampicilina. Passa a fazer uso de ceftriaxona, sendo identificada melhora do acometimento pulmonar a partir do 3ª dia de uso do antibiótico."

45. Considerando que há interação entre a terapia antimicrobiana e hormonal, é correto afirmar que pode ocorrer:
- aumento da eficácia do contraceptivo.
 - redução da eficácia do antibiótico.
 - inativação do efeito contraceptivo.
 - aumento do efeito antibiótico.
 - redução da eficácia do contraceptivo.
46. Tendo em vista o arcabouço legal que envolve a Política de Segurança do Paciente. Marque a alternativa que apresenta o documento legal que institui o Programa Nacional de Segurança do Paciente.
- Portaria nº 529, de 1º de abril de 2013.
 - RDC nº36, de 25 de julho de 2013.
 - Portaria nº1377, de 09 de julho de 2013.
 - Portaria nº2095, de 24 de setembro de 2013.
 - Portaria nº1378, de 09 de julho de 2013.

Leia o texto abaixo para responder à questão 47

Texto

"Uma licitação pode seguir modalidades distintas, definidas pelo valor estimado para o objeto a ser adquirido ou pelas características da modalidade."

(BRASIL, 1993; MARIN et al., 2003)

47. Considerando a modalidade de licitação, classificada pelo valor financeiro, marque a alternativa correta.
- Dispensa: qualquer valor.
 - Convite: Entre R\$ 8.000,00 e R\$ 80.000,00.
 - Tomada de preço: Entre R\$ 60.000,00 e R\$ 85.000,00.
 - Concorrência pública: Até R\$ 650.000,00.
 - Pregão: Acima de R\$ 650.000,00.
48. Um determinado medicamento apresenta um consumo médio mensal (CMM) de 250 unidades, com um grau de atendimento de 90%. Sabendo-se que o prazo de abastecimento é de 40 dias, o nível de estoque que sinaliza o Ponto de Pedido (PP) é:
- 357 unidades.
 - 10.225 unidades.
 - 10.000 unidades.
 - 557 unidades.
 - 476 unidades.

Leia o texto abaixo para responder à questão 49

Texto

"O Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde (Qualifar-SUS) tem a finalidade de contribuir para o processo de aprimoramento, de implementação e de integração sistêmica das atividades da Assistência Farmacêutica nas ações e nos serviços de saúde, visando à atenção contínua, integral, segura, responsável e humanizada. "

(BRASIL, Ministério da Saúde. 2016)

49. Considerando a organização do Qualifar-SUS em quatro eixos, é correto afirmar que:
- o eixo Informação insere a Assistência Farmacêutica nas práticas clínicas, visando à resolutividade das ações em saúde, otimizando os benefícios e minimizando os riscos relacionados à farmacoterapia.
 - o eixo Educação produz documentos técnicos e disponibiliza informações que possibilitem o acompanhamento, o monitoramento e a avaliação das ações e serviços da Assistência Farmacêutica.
 - o eixo Cuidado promove a educação permanente e a capacitação dos profissionais de saúde, para qualificação das ações da Assistência Farmacêutica na prática profissional.
 - o eixo Estrutura contribui para a estruturação dos serviços farmacêuticos no SUS considerando inserir a Assistência Farmacêutica nas práticas clínicas, visando à resolutividade das ações em saúde.
 - o eixo Cuidado insere a Assistência Farmacêutica nas práticas clínicas, visando à resolutividade das ações em saúde, otimizando os benefícios e minimizando os riscos relacionados à farmacoterapia.
50. No Protocolo de Segurança na Prescrição, Uso e Administração de medicamentos, no que concerne à expressão de doses, é correto afirmar que:
- é possível incluir abreviaturas das unidades de medida, de microgramas a gramas.
 - unidades de medidas não métricas (colher, ampola, frasco) podem ser utilizadas para facilitar a compreensão do usuário.
 - na definição da concentração de um medicamento fica livre a forma de prescrever doses que possuam o zero antes da vírgula (Ex. 500mg ou 0,5g).
 - o sistema métrico pode variar, de acordo com a determinação do prescritor.
 - não se deve utilizar "ponto" em substituição à vírgula, pois aumenta o risco de erro de doses.



UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ
PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE - 2021
Categoria Profissional: Farmácia

GABARITO DO CANDIDATO

O gabarito poderá ser copiado, **SOMENTE**, no espelho constante no final do boletim de questões disponibilizado para este fim que somente será destacado no final de sua prova, pelo fiscal de sua sala.

QUESTÃO	ALTERNATIVA	QUESTÃO	ALTERNATIVA
1		26	
2		27	
3		28	
4		29	
5		30	
6		31	
7		32	
8		33	
9		34	
10		35	
11		36	
12		37	
13		38	
14		39	
15		40	
16		41	
17		42	
18		43	
19		44	
20		45	
21		46	
22		47	
23		48	
24		49	
25		50	